

FIGO Initiative to Prevent Unsafe Abortion

Arsen Askerov

11 September, 2009

Tbilisi, Georgia





Total population: 5,4 million
Urban – 35%
Rural – 65%
Women of fertile age – 27%
Children from 0 to 15 – 34,5%
Adolescents – 7%





Challenges

- 80% of territory are mountains
- 44% of population are below poverty level; and 70% out of them under the extreme poverty line
- 62,5 Maternal Mortality Ratio



Challenges

- 32,3 % of youth have sexual experience before age 15
- 46,7% do not use contraceptives
- 70-85% of pregnancies among young girls end with abortions
- 50% of young people have sexual experience before the marriage
- Due to social norms and high level of poverty young people have lack access to social services and information, especially girls
- High level of unemployment among young people
- High level of labor migration among young people



The problem of abortion in Kyrgyzstan is continuing to have national character.

- So, from 10 pregnancies 7 end in abortions,
- each 10th abortion is performed for persons at the age under 19,
- more than 200 abortions are performed for teenagers at the age under 14.
- A high level of post-abortion complications is remaining.




Reasons Causing Incompleteness of Statistical Accounting

- Wide introduce in practice of public health of private clinics where abortions are performed;
- Imperfectness of statistical accounting in private clinics for gaining financial income - almost half STP is not registered;
- Introduce of so-payment for performance of medical abortions - search of services of much lower cost in the private clinics or at the doctors of private practice.



The number abortion on 1000 WFA





Achievements (1)

- We updated and published of training curricula and materials for FP/RH SOP including FP counseling, infection control, proper IUD insertion,
- Working group adapted and revised of clinical protocols and WHO guidelines on Family Planning “Medical eligibility of contraceptives”



Plan of Action of Kyrgyzstan

Overall goal:

- To reduce unwanted pregnancies and
To improve access to safe abortion
services

Purposes:

- To increase contraceptive prevalence rate
- To increase access to high quality PA
services
- To improve population access to information
and educational programs in Family Planning
and sexual reproductive health and rights



13 6 2006



Achievements (2)

- “Coalition on safe abortion, postabortion care and contraceptions” has been created in the Kyrgyz Republic on the initiative of the Alliance of reproductive health.
- Some professional organizations (KAAN), nongovernmental organization (the Alliance of reproductive health), Ministry of the Public Health, pharmaceutical campaigns, organization of insurance medicine, private clinics) are the members of the coalition.





Achievements (2)

- "National Forum to Associations of Obstetrician-gynecologists and neonatologists has been held, where the plan of actions toward safe abortion in Kyrgyz Republic and the main strategic actions of the associations was considered and approved .



это может быть твоя дочь...
твоя жена... твоя сестра...
это можешь быть ты...





Achievements (2)

- The evaluation and the need in the physicians who were trained to the method of safe interruption to pregnancy and postabortion care and, have been conducted.
- In Kyrgyz Republic in 2007-2008 registered medicines for medical interruption of pregnancy "



Achievements (2)

- The protocol "Medical interruption of pregnancy" has been collaborated
- We organized training courses for 25 physicians of pilot organization and department of postgraduate education. for introducing the medical interruptions of pregnancy " and pre- and postabortion care



Achievements (2)

- The mechanisms of monitoring of efficiency and safe of the medical interruptions to pregnancy was developed









ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!

Решения, которые касаются твоего здоровья, можешь принимать только ты!

Репродуктивное здоровье - это сохранение здоровья женщин и мужчин для создания счастливой семьи и рождения здоровых, желанных детей.

Использование методов контрацепции - основа планирования семьи и защита от нежелательной беременности и абортов.

Планирование семьи - международное право каждого человека решать, когда и сколько иметь детей, предотвращать нежелательную беременность при помощи контрацептивных средств. Планирование позволяет иметь здоровых, желанных детей. Ответственность за детей несут мужчина и женщина.

Что нужно знать при планировании семьи:

- беременность в возрасте до 18 и после 35 лет опасна для здоровья матери и ребенка
- интервалы между родами должны быть не менее 3-4 лет
- аборт не является лучшим методом регулирования беременности, его можно избежать, применяя современные методы контрацепции
- ИППП являются причиной бесплодия у мужчин и женщин

Контрацепция

Это методы и средства предотвращения нежелательной беременности

| Презерватив | Гормональные контрацептивы | Спермициды |
|--|--|---|
| Предотвращает попадание сперматозоидов в половые пути девушки. Защищает от ИППП, ВИЧ/СПИД. | Это таблетки, которые содержат гормоны, препятствующие образованию яйцеклетки. | Это вещества, разрушающие сперматозоиды. Выпускаются в виде кремов, свечей, таблеток. |

Прежде чем использовать средства контрацепции, посоветуйся с врачом!

ИППП - инфекции, передающиеся половым путем:

- сифилис
- гонорея
- трихомониаз
- хламидиоз
- герпес

Симптомы ИППП:

- необычные выделения из половых органов с неприятным запахом
- зуд, жжение в области половых органов
- высыпания, язвочки на половых органах
- частые, болезненные мочеиспускания
- появление сыпи на теле

При появлении этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу.

Чем опасны ИППП:

- нельзя вылечить самостоятельно
- если не лечить, они переходят в хроническую стадию
- часто приводят к бесплодию как у мужчин, так и у женщин
- передаются от больной матери к ребенку во время беременности, родов, при кормлении грудью

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека, вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Люди, зараженные ВИЧ, могут носить эту инфекцию несколько лет, даже не подозревая об этом, но в то же время являются переносчиками ВИЧ-инфекции.

Вирус передается:

- при половом контакте, анализом, орально-вагинальным, припарками крови и использование зараженных кровью ит. Имей в виду, что большая часть зараженных ВИЧ-инфекцией - это инъекционные наркоманы.
- от матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью

Вирус не передается:

- при рукопожатии, поцелуе;
- через общую посуду и бытовые приборы;
- через укусы насекомых и домашних животных;
- при посещении бани, бассейна.

Использование презерватива - лучшая защита от ИППП и ВИЧ/СПИДа.





СҮЙҮҮ СЫНАГЫ ЛЮБОВЬ, КАК ИСПЫТАНИЕ