

«ЭВОЛЮЦИЯ» АБОРТА В ГРУЗИИ

Проф. А. Хомасуридзе

11 Сентября 2009 г.


Тбилиси, Грузия

ИСТОРИЯ АБОРТОВ В ГРУЗИИ


1987 г.

- **Общее число аборт** - 300 000
- **Нелегальные аборты** - 2 / 3
- **Рождаемость** - 100 000
- **Применение контрацептивов** - 0


Реализация репродуктивной функции женщин 1991-2008 гг.



Динамика распространенности абортов в Грузии 1991-2008 гг.



Процентное соотношение числа аборт и новорожденных в Грузии 1991 – 2008 гг.



ИСТОРИЯ АБОРТОВ В ГРУЗИИ

2008 г.

- **ОБЩЕЕ ЧИСЛО АБОРТОВ** - 30 000
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРАЦЕПТИВОВ** - 60 %

НИИ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА ИМ. И. ЖОРДАНИЯ



ЭТЬЕН-ЭМИЛЬ БОЛЬЕ, 1983 г.



ИСТОРИЯ КОНТРАЦЕПЦИИ НАЧАЛАСЬ В ГРУЗИИ С 1985 г.


GIORDANO BRUNO



В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ КОНТРАЦЕПЦИЯ СУЩЕСТВОВАЛА В УСЛОВИЯХ ИНКВИЗИЦИИ



НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ МИФЕПРИСТОНА В ГРУЗИИ



Список опубликованных трудов выполненных в рамках сотрудничества с ВОЗ

1. Использование низкой дозы мифепристона и гемепроста для медикаментозного аборта при 57-63 - дневной беременности.
2. Низкая доза мифепристона и гемепроста для прерывания беременности ранних сроков.
3. Использование двух однократных доз RU-486 в комбинации с мизопростолом для прерывания беременности.
4. Использование двух однократных доз RU-486 в комбинации с сульпростоном для прерывания беременности.
5. Использование режима Юзпэ и левоноргестрела при неотложной контрацепции.
6. Использование малой дозы мифепристона и двух режимов левоноргестрела при неотложной контрацепции.
7. Использование трёх доз мифепристона при неотложной контрацепции.

- **THE LANCET**
- **British Journal of Obstetrics and Gynaecology**
- **Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica**

ОБЩЕЕ ЧИСЛО МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ АБОРТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ ИНСТИТУТОМ

32 000 пациенток

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К МИФЕПРИСТОНУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ

I триместр беременности

Срок гестации



Чувствительность


II-III триместры беременности

Срок гестации



Чувствительность

Концентрация β – хориогонина до и после медикаментозного аборта



МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ МИФЕПРИСТОНА ВО II И III ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ

- ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ II ТРИМЕСТРА ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ (МЕРТВЫЙ ПЛОД, ПОРОКИ ЕГО РАЗВИТИЯ);
- ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ II ТРИМЕСТРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ;
- ПОДГОТОВКА ШЕЙКИ МАТКИ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ;
- ПЕРЕНОШЕННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ;
- ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ III ТРИМЕСТРА ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ;
- СЛАБОСТЬ И ДИСКООРДИНАЦИЯ РОДОВОЙ АКТИВНОСТИ;
- ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИЗЛИТИЕ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД;
- ПОДГОТОВКА ШЕЙКИ МАТКИ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РОДОВ.