

A stylized map of Georgia is shown in a lighter blue color against a darker blue background. The map is centered and occupies a significant portion of the slide. The title text is overlaid on the map.

Регистрация и маркирование лекарств

Дмитрий Кочев, «Пенкрофт
фарма» (Pentcroft Pharma)

*10 сентября 2009 г.
Тбилиси, Грузия*

Россия

Мифепристон в России

С 1999 г. распространялся под названием «Мифегин» и «Пенкрофтон»

С 2003 г. распространяется под названием «Мифепристон»

Мизопростол в России

До 2006 г. распространялся под названием «Сайтотек» и «Артротек»

Начиная с 2006 г. инструкции по применению мизопростола для проведения медикаментозного аборта используют названия «Мизопростол» и «Миролют»

Методы прерывания беременности, используемые в России

Первый триместр

- ЭВА и МВА
- Дилатация и кюретаж (D & C)
- Медикаментозный аборт с использованием мифепристона и мизопростола (600 + 400)

Второй триместр

- Интраамниальный гипертонический раствор или Этакридина лактат
- Дилатация и эвакуация (D & E)
- Интрацервикальные простагландины
- D&E проводится очень редко

Наркоз

- Местный
- Общий
- Обезболивание

**Процедура
бесплатна для
пациентки!!!!**

Российские учреждения, предоставляющие услугу аборта




Россия

Статистики аборта в России (2007 г.)



D&C в 1-м триместре

78,4 %



22,5 %

МВА и ЭВА при сроках
беременности до 12 недель


Мифепристон с мизопростолом
вплоть до 42 дней аменореи

1,72 %



>4 %

2-й триместр
Интраамниальный
раствор



1-й триместр— 1 219 040 (93,5%)

2-й триместр – 63 170 (4,85%)

Общее количество—1 302 480 (по официальным данным)

Оценка экспертов—количество выше на 2 миллиона

Мифепристон и мизопростол в России (2009 г.)

1-й триместр—использование с 2002 г. в течение 42 д. аменореи
Инструкции к препаратам не предусматривают использования во 2-м триместре

В России только в одном роддоме мифепристон с мизопростолом
используются при прерывании беременности во 2-м триместре


200 аборт на 2007-2008 гг

Метод

3 таблетки мифепристона перорально (200 мг каждые 4 часа) + затем
приём перорального мизопростола (200 мкг каждые 4 часа)

Россия

Экспертная оценка количества медикаментозных аборт в России




Оценка Минздрава—1,56%
Во Франции 56%, в Швеции 51%

Россия

Расширение торговли мифепристом в России

Общее количество (около 400 000 распространённых упаковок с тремя таблетками на каждую)



Россия

Мифепристон в России

Существует только один официальный протокол—
«Французский протокол» 600 мг мифепристона + 400 мкг
перорального мизопростола.

Некоторые из наших клиентов используют новый протокол:
200 мг мифепристона + 400 мкг сублингвального
мизопростола.

НО НЕОФИЦАЛЬНО

Ни у кого не возникает проблем

Некоторые из клиентов используют «собственный»
протокол:

600-200 мг мифепристона + 400-600 мкг мизопростола

Россия

Проблемы распространения мед аборта в России

1. Отсутствие пока легальной возможности работать по современным протоколам. Сдвиги есть, но результатов пока нет.
2. Потребность в обучении и убеждении врачей в современной технологии, боязнь работать по новому из-за отсутствия легальности.
3. Ограничения в работе государственной системы из-за запрещения платных услуг.
4. Высокая стоимость медицинских услуг в коммерческих центрах.
5. Индифферентность государственной системы к улучшению ситуации в области абортов и концентрация только на демографической проблеме.

Положительные моменты

1. Метод хорошо воспринимается пациентками и они его знают.
2. Есть во всех регионах России.
3. Наличие препаратов постоянно и есть выбор между ними (конкуренция дистрибьюторов)

Грузия

Пенкрофтон распространяется с 2004 г.

Импульс торговле, которая по-настоящему
началась в 2008 г., дали СЕМЕЙНЫЕ
врачи

Общее количество упаковок в 2008-
09 гг.—800, по 3 таблетки на упаковку

Армения и Азербайджан

Провели клинические испытания
Пекрофтона, Мифепристона и
Мизопростола в 2008 г., совместно с
Gynuity Health Projects

Мы занимаемся поисками коммерческой
организации, которая согласна
распространять препараты в этих регионах.

Узбекистан

Пенкрофтон имеет сертификат, подтверждающий регистрацию, но он не распространяется по этой территории. Главная причина—экономическая ситуация с использованием заграничной валюты.

Были проведены клинические испытания Пенкрофтона и Мизопростола в сотрудничестве с Gynuity Health Projects в 2008 г.

Мы занимаемся поисками коммерческой организации, которая согласна распространять препараты в этом регионе.

Казахстан

Мифепристон и Мизопростол
зарегистрированы на данной территории
(китайским производителем)

A blue silhouette map of Kazakhstan is centered on a dark blue background with a light blue grid of latitude and longitude lines. The map is oriented horizontally, showing the country's borders with Russia to the north and China to the east.

Проблемы распространения мед аборта

1. Поиск достойного партнера при возможности сразу работать по современным протоколам. Проблем с регистрацией особых нет.
2. Необходимость в масштабном обучении и убеждении врачей в современной технологии, боязнь некоторых руководителей выпустить «джина из бутылки» подчас сдерживает внедрение.
3. Ограничения в работе государственной системы из-за запрещения платных услуг.
4. Высокая стоимость медицинских услуг в коммерческих центрах.
5. Индифферентность государственной системы к улучшению ситуации в области абортов и концентрация только на демографической проблеме.

Положительные моменты

1. Метод хорошо воспринимается пациентками и они его знают.
2. Наличие препаратов постоянно и есть выбор между ними (конкуренция дистрибьюторов)